

FAHL® OPTIFLUID® Lubricant Gel vizuální sístokní géli máloviskózný, nemolekulárny trachéostómabá váz bevezetésre alkalmas, kiegészítő szolgálat.

VII. HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

Higiéniai előírások használat előtt mossák meg a kezét. Vegyen fel kis mennyiségű FAHL® OPTIFLUID® Lubricant Gel anyagot egy ujjal és az emelkedés flikkelendő Ө а/б. Óvatosan dörzsölje az a gélt a tracheális kánálú külső csővére Ө. Most helyezze be a tracheális kánálú a szokásos módon a tracheostómába.

VI.ÁGYAZATI

Сemmi esetre se vigyen fel nagyobb mennyiségűeket, és ne helyezze be a kánált, ha még cseregrő a küvdesség. Ne érnisse meg a csőnyílást az újjal közvetlenül!

VI.ÁGYAZATI

Típus a FAHL® OPTIFLUID® Lubricant Gel anyagot közvetlenül a légzőnyílásba bevinnék!

VII.ÁROLÁS

Tárolja a FAHL® OPTIFLUID® Lubricant Gel hélyen, hűvös, sötét helyen. Ne tárolja közvetlen napfénytől két hélyen. Minden alkalommal után azonnal zárja le a zárókaput, illetve helyezze a tárolókúpát a tasakok kárára. Vegye figyelembe az eltarthatósági határidőket a használati útmutatóban. A cső felhívása után a tracheostómát FAHL® OPTIFLUID® Lubricant Gel csak 30 napra alkalmazható.

VIII. STERILIZÁLÁS

Ismételt sterilizálás megengedhetetlen.

IX. TARTALMAZOTT ANGYAGOK

Тездэты глицерин, гидроксиетилцеллоза, феноксиетанол, этилгексилглицерин, метилцинкодиолон, пропилглицерин, глицерин, имидозолидин уреа, пропиленгликол, аспартам, динатрий-ЕДТА.

X. JOGI ÚTMUTATÓK

A gyártó, az Andreas FahI Medizintechnik-VetrieB GmbH vállalat felelősséget vállal a termék minőségével kapcsolatban (különösen nem funkcióvesztést, sérülést, fertőzésért, illetve más komplikációt vagy nem kívánt eseményt). A termék nem alkalmas működtetésre, nem szabad a termékkel végezhető javításra vagy más szakember használatára, gondozására felkészült (tisztítás/fertőtlenítés), és/vagy a termék az ebben a használati útmutatóban meghatározott előírásoktól eltérően. Ez érvényes a további módosítások a irányvonalakkal. A magán a terméken új módon bekezelést károsodások, illetve az összes új módon okozott következmények károsodása is. Ha az Andreas FahI Medizintechnik-VetrieB GmbH vállalat nem felelősséget vállal a termék működtetésével, használata, illetve az okozott károkért, amelyben az gyártóknak és/vagy a betegnek állítólagos felelőssége található. A gyártó fenntartja a mindenkor termékváltoztatás jogát! FAHL® az Andreas FahI Medizintechnik-VetrieB GmbH, Köln Németországban és EU-tagállamokban bevezetett védjegyé.

PL I. WPROWADZENIE

Niniejsza instrukcja obowiązuje dla FAHL® OPTIFLUID® Lubricant Gel. Instrukcja użycia jest przeznaczona dla lekarzy, personelu pielęgniarskiego i pacjentów/rodziców w celu zapewnienia prawidłowego użytkowania. Przed pierwszym zastosowaniem produktu należy dokładnie przeczytać instrukcję użycia!

II. UŻYCIEMOŻE ZGODNIE Z PRZEZNACZENIEM

FAHL® OPTIFLUID® Lubricant Gel jest zalem wyprodukowanym na bazie wody i ułatwia wprowadzanie rurek tracheostomijnych do otworu tracheostomijnego. Przed pierwszym użyciem zaley należy dokładnie bezwzględnie przeczytać wszelkie wskazówki dotyczących pielęgnacji rurek przez wytwórcę rurek.

III. OSTRZEŻENIA

FAHL® OPTIFLUID® Lubricant Gel jest produktem przeznaczonym dla jednego pacjenta. Nie używaj, jeśli zażytkowa lub tubka. W przypadku miejscowego zacczerwienia bądź podrażnienia skóry lub zędo samopoczucia należy natychmiast zaprzestaa stosowania OPTIFLUID® Lubricant Gel. Istniejące podrażnienia skóry należy natychmiast przetrzeć wodą.

IV. PRZECIWSKAZANIA

Nie stosować FAHL® OPTIFLUID® Lubricant Gel w przypadku uczulecia na jego składniki.

V. OPIS PRODUKTU

FAHL® OPTIFLUID® Lubricant Gel jest zalem wyprodukowanym na bazie wody i ułatwia wprowadzanie rurek tracheostomijnych do otworu tracheostomijnego.

Nie stosować FAHL® OPTIFLUID® Lubricant Gel w przypadku uczulecia na jego składniki.

VI. INSTRUKCJA

Przed użyciem umyj ręce ze względu higieniczności.Nalozyc niewielką ilość FAHL® OPTIFLUID® Lubricant Gel za pomocą szpatułki lub palca wskazującego Ө. Ostrożnie rozetrz szpat. na kanale zewnętrzny ruki tracheostomijnej Ө. Wprowadz rurek tracheostomijną do otworu tracheostomijnego jak dotychczas Ө.

VII. STERYLIZACJA

W żadnym razie nie wolno nakładać większych ilości ani nie wprowadzać mokrej, kroplącej ruki. Nie dotykaj bezpośrednio palcami otworu tubki!

UWAGA!

Przy powoak FAHL® OPTIFLUID® Lubricant Gel bezpośrednio do otworu oddechowego!

VIII. PRZECIWOZWYNIENIE

Przeciwozwynie FAHL® OPTIFLUID® Lubricant Gel w chłodnym, ciemnym miejscu. Nie przechowywać w ciepłym miejscu. Nie narażaj na działanie promieniowania ultrafioletowego. Należy chronić przed światłem słonecznym. Należy chronić przed światłem ultrafioletowym.

W żadnym razie nie wolno nakładać większych ilości ani nie wprowadzać mokrej, kroplącej ruki. Nie dotykaj bezpośrednio palcami otworu tubki!

UWAGA!

Przy powoak FAHL® OPTIFLUID® Lubricant Gel bezpośrednio do otworu oddechowego!

VIII. STERYLIZACJA

W żadnym razie nie wolno nakładać większych ilości ani nie wprowadzać mokrej, kroplącej ruki. Nie dotykaj bezpośrednio palcami otworu tubki!

IX. SKŁADNIKI

Woda, octanowa, glicerol, hydroxyetyloceluloza, fenoksietanol, ethylhexylglycerol, metznk imidazolidynil, glicol propylenowy, aspartam, wersenian disodowy EDTA.

X. INFORMACJE PRAWNE

Wytwórcza Andreas FahI Medizintechnik-VetrieB GmbH nie przyjmuje odpowiedzialności za szkody wynikające z niewłaściwego działania, obrażenia, zakażenia lub inne powikłania lub inne niepożądane działania) powstałe w wyniku samowolnych zmian produktu lub niewłaściwego produktu lub niewłaściwego użytkownika. Nie gwarantujemy, że produkt jest wolny od błędów. Nie gwarantujemy, że produkt jest wolny od błędów. Nie gwarantujemy, że produkt jest wolny od błędów. Nie gwarantujemy, że produkt jest wolny od błędów.

RU I. ПРЕДПОСЛОВИЕ

Настоящая инструкция относится к FAHL® OPTIFLUID® Lubricant Gel. Руководство адресовано врачам, медицинскому персоналу и пациентам/родителям в целях обеспечения правильного использования изделия. Перед первым использованием изделия внимательно ознакомьтесь с указаниями по применению!

II. ПРИМЕНЕНИЕ ПО НАЗНАЧЕНИЮ

FAHL® OPTIFLUID® Lubricant Gel - это гель-смазка на водной основе, облегчающая введение трахеостомической канюли в трахеостому. Перед первым применением геля следует обязательно выполнять указания по уходу, выданные производителем канюли.

RU I. ПРЕДПОСЛОВИЕ

Настоящая инструкция относится к FAHL® OPTIFLUID® Lubricant Gel. Руководство адресовано врачам, медицинскому персоналу и пациентам/родителям в целях обеспечения правильного использования изделия. Перед первым использованием изделия внимательно ознакомьтесь с указаниями по применению!

II. ПРИМЕНЕНИЕ ПО НАЗНАЧЕНИЮ

FAHL® OPTIFLUID® Lubricant Gel - это гель-смазка на водной основе, облегчающая введение трахеостомической канюли в трахеостому. Перед первым применением геля следует обязательно выполнять указания по уходу, выданные производителем канюли.

III. ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ

FAHL® OPTIFLUID® Lubricant Gel предназначен для использования только на пациентах. Не используйте его повторно в случае повреждения канюли или тюбика. В случае появления местных раздражений и покраснения кожи, а также любых других побочных эффектов немедленно прекратите использование FAHL® OPTIFLUID® Lubricant Gel и обратитесь к врачу. Не используйте FAHL® OPTIFLUID® Lubricant Gel для других целей, кроме указанной в назначении.

Не используйте FAHL® OPTIFLUID® Lubricant Gel при наличии аллергии на компоненты клея.

V. ОПИСАНИЕ ИЗДЕЛИЯ

FAHL® OPTIFLUID® Lubricant Gel - это гель-смазка на водной основе, облегчающая введение трахеостомической канюли в трахеостому.

VI. СТРУКТУРА

Для предотвращения гибели протокте рупи перед применением, необходимо использовать количество FAHL® OPTIFLUID® Lubricant Gel с помощью чистого безворсового флизинозного салфетки Ө а/б. Осторожно разотрите гел на наружной стороне трахеостомической канюли Ө. Затем введите трухеостомическую канюлю в трахеостому обычным путем Ө.

ОСТОРОЖНО!

Ни в коем случае не наносите большое количество средства и не допускайте появления капель при установке канюли. Не прикасайтесь пальцем непосредственно к отверстию тюбика.

Ни в коем случае не используйте FAHL®OPTIFLUID® Lubricant Gel непосредственно в дыхательные отверстия!

Хранить FAHL® OPTIFLUID® Lubricant Gel в прохладном и защищенном от света месте. Не хранить под прямым воздействием света. Сразу после применения закройте канюлю или выберите тюбик. Соблюдайте срок годности и не используйте гель после его истечения. После вскрытия тюбика Lubricant Gel пригоден к применению в течение 30 дней.

VII. ХРАНЕНИЕ

Хранить FAHL® OPTIFLUID® Lubricant Gel в прохладном и защищенном от света месте. Не хранить под прямым воздействием света. Сразу после применения закройте канюлю или выберите тюбик. Соблюдайте срок годности и не используйте гель после его истечения. После вскрытия тюбика Lubricant Gel пригоден к применению в течение 30 дней.

VIII. СТЕРИЛИЗАЦИЯ

Повторная стерилизация не допускается.

IX. ИНГРЕДИЕНТЫ

Вода очищенная, глицерин, гидроксиэтилцеллозола, феноксиетанол, этилгексилглицерин, имидозолидин уреа, пропиленгликоль, аспартам, динатрий-ЕДТА.

X. ПРАВОВАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Фирма-изготовитель Andreas FahI Medizintechnik-VetrieB GmbH не несет ответственности за повреждения (в частности, за повреждение тканей, инфицирование, ожоги, раздражения или прочие инциденты), вызванные самостоятельными изменениями изделия, ремонтом, выполненном не фирмой-изготовителем, или неправильным обращением, уходом (чисткой/дезинфекцией) или хранением изделия с нарушением положений данного руководства. Это относится - в допустимой степени мере - как к выводуемым данным действиями пользователя, так и к любым возникшим в результате повреждениям в связи с этим косвенному ущербу. В случае возникновения серьезных повреждений в связи с данным изделием Andreas FahI Medizintechnik-VetrieB GmbH о нем следует сообщать производителю и в соответствующей инструкции производителя-члена ЕС, в которой промовает пользователь или пациент. Истежителю остается за собой право на изменения информации, содержащейся в зарегистрированной в Германии документации другого стран-членех ЕС торговой марки компании Andreas FahI Medizintechnik-VetrieB GmbH, г. Köln.

CS I. ÚVOD

Tento návod platí pro lubrikační gel FAHL® OPTIFLUID® Lubricant Gel. Slouží jako informace pro lékaře, zdravotní personál a pacienty/roděčatele, jak má výrobek správně používat. Před prvním použitím výrobku si pečlivě prostudujte pokyny k použití výrobku!

FAHL® OPTIFLUID® Lubricant Gel je určen pro jednoho pacienta. Ne upoužijte, pokud jsou vidět známky podráždění nebo tuba poškozené. Při místním zarudnutí nebo podráždění kůže a při nevolnosti ihned přestaňte lubrikační gel FAHL® OPTIFLUID® Lubricant Gel používat. Pokud se objeví známky podráždění kůže, okamžitě přestaňte výrobek používat. Pokud se objeví známky podráždění kůže, okamžitě přestaňte výrobek používat.

FAHL® OPTIFLUID® Lubricant Gel je určen pro jednoho pacienta. Ne upoužijte, pokud jsou vidět známky podráždění nebo tuba poškozené. Při místním zarudnutí nebo podráždění kůže a při nevolnosti ihned přestaňte lubrikační gel FAHL® OPTIFLUID® Lubricant Gel používat. Pokud se objeví známky podráždění kůže, okamžitě přestaňte výrobek používat. Pokud se objeví známky podráždění kůže, okamžitě přestaňte výrobek používat.

FAHL® OPTIFLUID® Lubricant Gel je určen pro jednoho pacienta. Ne upoužijte, pokud jsou vidět známky podráždění nebo tuba poškozené. Při místním zarudnutí nebo podráždění kůže a při nevolnosti ihned přestaňte lubrikační gel FAHL® OPTIFLUID® Lubricant Gel používat. Pokud se objeví známky podráždění kůže, okamžitě přestaňte výrobek používat. Pokud se objeví známky podráždění kůže, okamžitě přestaňte výrobek používat.

FAHL® OPTIFLUID® Lubricant Gel je určen pro jednoho pacienta. Ne upoužijte, pokud jsou vidět známky podráždění nebo tuba poškozené. Při místním zarudnutí nebo podráždění kůže a při nevolnosti ihned přestaňte lubrikační gel FAHL® OPTIFLUID® Lubricant Gel používat. Pokud se objeví známky podráždění kůže, okamžitě přestaňte výrobek používat. Pokud se objeví známky podráždění kůže, okamžitě přestaňte výrobek používat.

FAHL® OPTIFLUID® Lubricant Gel je určen pro jednoho pacienta. Ne upoužijte, pokud jsou vidět známky podráždění nebo tuba poškozené. Při místním zarudnutí nebo podráždění kůže a při nevolnosti ihned přestaňte lubrikační gel FAHL® OPTIFLUID® Lubricant Gel používat. Pokud se objeví známky podráždění kůže, okamžitě přestaňte výrobek používat. Pokud se objeví známky podráždění kůže, okamžitě přestaňte výrobek používat.

FAHL® OPTIFLUID® Lubricant Gel je určen pro jednoho pacienta. Ne upoužijte, pokud jsou vidět známky podráždění nebo tuba poškozené. Při místním zarudnutí nebo podráždění kůže a při nevolnosti ihned přestaňte lubrikační gel FAHL® OPTIFLUID® Lubricant Gel používat. Pokud se objeví známky podráždění kůže, okamžitě přestaňte výrobek používat. Pokud se objeví známky podráždění kůže, okamžitě přestaňte výrobek používat.

FAHL® OPTIFLUID® Lubricant Gel je určen pro jednoho pacienta. Ne upoužijte, pokud jsou vidět známky podráždění nebo tuba poškozené. Při místním zarudnutí nebo podráždění kůže a při nevolnosti ihned přestaňte lubrikační gel FAHL® OPTIFLUID® Lubricant Gel používat. Pokud se objeví známky podráždění kůže, okamžitě přestaňte výrobek používat. Pokud se objeví známky podráždění kůže, okamžitě přestaňte výrobek používat.

FAHL® OPTIFLUID® Lubricant Gel je určen pro jednoho pacienta. Ne upoužijte, pokud jsou vidět známky podráždění nebo tuba poškozené. Při místním zarudnutí nebo podráždění kůže a při nevolnosti ihned přestaňte lubrikační gel FAHL® OPTIFLUID® Lubricant Gel používat. Pokud se objeví známky podráždění kůže, okamžitě přestaňte výrobek používat. Pokud se objeví známky podráždění kůže, okamžitě přestaňte výrobek používat.

FAHL® OPTIFLUID® Lubricant Gel je určen pro jednoho pacienta. Ne upoužijte, pokud jsou vidět známky podráždění nebo tuba poškozené. Při místním zarudnutí nebo podráždění kůže a při nevolnosti ihned přestaňte lubrikační gel FAHL® OPTIFLUID® Lubricant Gel používat. Pokud se objeví známky podráždění kůže, okamžitě přestaňte výrobek používat. Pokud se objeví známky podráždění kůže, okamžitě přestaňte výrobek používat.

FAHL® OPTIFLUID® Lubricant Gel je určen pro jednoho pacienta. Ne upoužijte, pokud jsou vidět známky podráždění nebo tuba poškozené. Při místním zarudnutí nebo podráždění kůže a při nevolnosti ihned přestaňte lubrikační gel FAHL® OPTIFLUID® Lubricant Gel používat. Pokud se objeví známky podráždění kůže, okamžitě přestaňte výrobek používat. Pokud se objeví známky podráždění kůže, okamžitě přestaňte výrobek používat.

FAHL® OPTIFLUID® Lubricant Gel je určen pro jednoho pacienta. Ne upoužijte, pokud jsou vidět známky podráždění nebo tuba poškozené. Při místním zarudnutí nebo podráždění kůže a při nevolnosti ihned přestaňte lubrikační gel FAHL® OPTIFLUID® Lubricant Gel používat. Pokud se objeví známky podráždění kůže, okamžitě přestaňte výrobek používat. Pokud se objeví známky podráždění kůže, okamžitě přestaňte výrobek používat.

FAHL® OPTIFLUID® Lubricant Gel je určen pro jednoho pacienta. Ne upoužijte, pokud jsou vidět známky podráždění nebo tuba poškozené. Při místním zarudnutí nebo podráždění kůže a při nevolnosti ihned přestaňte lubrikační gel FAHL® OPTIFLUID® Lubricant Gel používat. Pokud se objeví známky podráždění kůže, okamžitě přestaňte výrobek používat. Pokud se objeví známky podráždění kůže, okamžitě přestaňte výrobek používat.

FAHL® OPTIFLUID® Lubricant Gel je určen pro jednoho pacienta. Ne upoužijte, pokud jsou vidět známky podráždění nebo tuba poškozené. Při místním zarudnutí nebo podráždění kůže a při nevolnosti ihned přestaňte lubrikační gel FAHL® OPTIFLUID® Lubricant Gel používat. Pokud se objeví známky podráždění kůže, okamžitě přestaňte výrobek používat. Pokud se objeví známky podráždění kůže, okamžitě přestaňte výrobek používat.

FAHL® OPTIFLUID® Lubricant Gel je určen pro jednoho pacienta. Ne upoužijte, pokud jsou vidět známky podráždění nebo tuba poškozené. Při místním zarudnutí nebo podráždění kůže a při nevolnosti ihned přestaňte lubrikační gel FAHL® OPTIFLUID® Lubricant Gel používat. Pokud se objeví známky podráždění kůže, okamžitě přestaňte výrobek používat. Pokud se objeví známky podráždění kůže, okamžitě přestaňte výrobek používat.

FAHL® OPTIFLUID® Lubricant Gel je určen pro jednoho pacienta. Ne upoužijte, pokud jsou vidět známky podráždění nebo tuba poškozené. Při místním zarudnutí nebo podráždění kůže a při nevolnosti ihned přestaňte lubrikační gel FAHL® OPTIFLUID® Lubricant Gel používat. Pokud se objeví známky podráždění kůže, okamžitě přestaňte výrobek používat. Pokud se objeví známky podráždění kůže, okamžitě přestaňte výrobek používat.

FAHL® OPTIFLUID® Lubricant Gel je určen pro jednoho pacienta. Ne upoužijte, pokud jsou vidět známky podráždění nebo tuba poškozené. Při místním zarudnutí nebo podráždění kůže a při nevolnosti ihned přestaňte lubrikační gel FAHL® OPTIFLUID® Lubricant Gel používat. Pokud se objeví známky podráždění kůže, okamžitě přestaňte výrobek používat. Pokud se objeví známky podráždění kůže, okamžitě přestaňte výrobek používat.

FAHL® OPTIFLUID® Lubricant Gel je určen pro jednoho pacienta. Ne upoužijte, pokud jsou vidět známky podráždění nebo tuba poškozené. Při místním zarudnutí nebo podráždění kůže a při nevolnosti ihned přestaňte lubrikační gel FAHL® OPTIFLUID® Lubricant Gel používat. Pokud se objeví známky podráždění kůže, okamžitě přestaňte výrobek používat. Pokud se objeví známky podráždění kůže, okamžitě přestaňte výrobek používat.

FAHL® OPTIFLUID® Lubricant Gel je určen pro jednoho pacienta. Ne upoužijte, pokud jsou vidět známky podráždění nebo tuba poškozené. Při místním zarudnutí nebo podráždění kůže a při nevolnosti ihned přestaňte lubrikační gel FAHL® OPTIFLUID® Lubricant Gel používat. Pokud se objeví známky podráždění kůže, okamžitě přestaňte výrobek používat. Pokud se objeví známky podráždění kůže, okamžitě přestaňte výrobek používat.

FAHL® OPTIFLUID® Lubricant Gel je určen pro jednoho pacienta. Ne upoužijte, pokud jsou vidět známky podráždění nebo tuba poškozené. Při místním zarudnutí nebo podráždění kůže a při nevolnosti ihned přestaňte lubrikační gel FAHL® OPTIFLUID® Lubricant Gel používat. Pokud se objeví známky podráždění kůže, okamžitě přestaňte výrobek používat. Pokud se objeví známky podráždění kůže, okamžitě přestaňte výrobek používat.

FAHL® OPTIFLUID® Lubricant Gel je určen pro jednoho pacienta. Ne upoužijte, pokud jsou vidět známky podráždění nebo tuba poškozené. Při místním zarudnutí nebo podráždění kůže a při nevolnosti ihned přestaňte lubrikační gel FAHL® OPTIFLUID® Lubricant Gel používat. Pokud se objeví známky podráždění kůže, okamžitě přestaňte výrobek používat. Pokud se objeví známky podráždění kůže, okamžitě přestaňte výrobek používat.

FAHL® OPTIFLUID® Lubricant Gel je určen pro jednoho pacienta. Ne upoužijte, pokud jsou vidět známky podráždění nebo tuba poškozené. Při místním zarudnutí nebo podráždění kůže a při nevolnosti ihned přestaňte lubrikační gel FAHL® OPTIFLUID® Lubricant Gel používat. Pokud se objeví známky podráždění kůže, okamžitě přestaňte výrobek používat. Pokud se objeví známky podráždění kůže, okamžitě přestaňte výrobek používat.

FAHL® OPTIFLUID® Lubricant Gel je určen pro jednoho pacienta. Ne upoužijte, pokud jsou vidět známky podráždění nebo tuba poškozené. Při místním zarudnutí nebo podráždění kůže a při nevolnosti ihned přestaňte lubrikační gel FAHL® OPTIFLUID® Lubricant Gel používat. Pokud se objeví známky podráždění kůže, okamžitě přestaňte výrobek používat. Pokud se objeví známky podráždění kůže, okamžitě přestaňte výrobek používat.

FAHL® OPTIFLUID® Lubricant Gel je určen pro jednoho pacienta. Ne upoužijte, pokud jsou vidět známky podráždění nebo tuba poškozené. Při místním zarudnutí nebo podráždění kůže a při nevolnosti ihned přestaňte lubrikační gel FAHL® OPTIFLUID® Lubricant Gel používat. Pokud se objeví známky podráždění kůže, okamžitě přestaňte výrobek používat. Pokud se objeví známky podráždění kůže, okamžitě přestaňte výrobek používat.

FAHL® OPTIFLUID® Lubricant Gel je určen pro jednoho pacienta. Ne upoužijte, pokud jsou vidět známky podráždění nebo tuba poškozené. Při místním zarudnutí nebo podráždění kůže a při nevolnosti ihned přestaňte lubrikační gel FAHL® OPTIFLUID® Lubricant Gel používat. Pokud se objeví známky podráždění kůže, okamžitě přestaňte výrobek používat. Pokud se objeví známky podráždění kůže, okamžitě přestaňte výrobek používat.

FAHL® OPTIFLUID® Lubricant Gel je určen pro jednoho pacienta. Ne upoužijte, pokud jsou vidět známky podráždění nebo tuba poškozené. Při místním zarudnutí nebo podráždění kůže a při nevolnosti ihned přestaňte lubrikační gel FAHL® OPTIFLUID® Lubricant Gel používat. Pokud se objeví známky podráždění kůže, okamžitě přestaňte výrobek používat. Pokud se objeví známky podráždění kůže, okamžitě přestaňte výrobek používat.

FAHL® OPTIFLUID® Lubricant Gel je určen pro jednoho pacienta. Ne upoužijte, pokud jsou vidět známky podráždění nebo tuba poškozené. Při místním zarudnutí nebo podráždění kůže a při nevolnosti ihned přestaňte lubrikační gel FAHL® OPTIFLUID® Lubricant Gel používat. Pokud se objeví známky podráždění kůže, okamžitě přestaňte výrobek používat. Pokud se objeví známky podráždění kůže, okamžitě přestaňte výrobek používat.

FAHL® OPTIFLUID® Lubricant Gel je určen pro jednoho pacienta. Ne upoužijte, pokud jsou vidět známky podráždění nebo tuba poškozené. Při místním zarudnutí nebo podráždění kůže a při nevolnosti ihned přestaňte lubrikační gel FAHL® OPTIFLUID® Lubricant Gel používat. Pokud se objeví známky podráždění kůže, okamžitě přestaňte výrobek používat. Pokud se objeví známky podráždění kůže, okamžitě přestaňte výrobek používat.

FAHL® OPTIFLUID® Lubricant Gel je určen pro jednoho pacienta. Ne upoužijte, pokud jsou vidět známky podráždění nebo tuba poškozené. Při místním zarudnutí nebo podráždění kůže a při nevolnosti ihned přestaňte lubrikační gel FAHL® OPTIFLUID® Lubricant Gel používat. Pokud se objeví známky podráždění kůže, okamžitě přestaňte výrobek používat. Pokud se objeví známky podráždění kůže, okamžitě přestaňte výrobek používat.

FAHL® OPTIFLUID® Lubricant Gel je určen pro jednoho pacienta. Ne upoužijte, pokud jsou vidět známky podráždění nebo tuba poškozené. Při místním zarudnutí nebo podráždění kůže a při nevolnosti ihned přestaňte lubrikační gel FAHL® OPTIFLUID® Lubricant Gel používat. Pokud se objeví známky podráždění kůže, okamžitě přestaňte výrobek používat. Pokud se objeví známky podráždění kůže, okamžitě přestaňte výrobek používat.

FAHL® OPTIFLUID® Lubricant Gel je určen pro jednoho pacienta. Ne upoužijte, pokud jsou vidět známky podráždění nebo tuba poškozené. Při místním zarudnutí nebo podráždění kůže a při nevolnosti ihned přestaňte lubrikační gel FAHL® OPTIFLUID® Lubricant Gel používat. Pokud se objeví známky podráždění kůže, okamžitě přestaňte výrobek používat. Pokud se objeví známky podráždění kůže, okamžitě přestaňte výrobek používat.

FAHL® OPTIFLUID® Lubricant Gel je určen pro jednoho pacienta. Ne upoužijte, pokud jsou vidět známky podráždění nebo tuba poškozené. Při místním zarudnutí nebo podráždění kůže a při nevolnosti ihned přestaňte lubrikační gel FAHL® OPTIFLUID® Lubricant Gel používat. Pokud se objeví známky podráždění kůže, okamžitě přestaňte výrobek používat. Pokud se objeví známky podráždění kůže, okamžitě přestaňte výrobek používat.

FAHL® OPTIFLUID® Lubricant Gel je určen pro jednoho pacienta. Ne upoužijte, pokud jsou vidět známky podráždění nebo tuba poškozené. Při místním zarudnutí nebo podráždění kůže a při nevolnosti ihned přestaňte lubrikační gel FAHL® OPTIFLUID® Lubricant Gel používat. Pokud se objeví známky podráždění kůže, okamžitě přestaňte výrobek používat. Pokud se objeví známky podráždění kůže, okamžitě přestaňte výrobek používat.

FAHL® OPTIFLUID® Lubricant Gel je určen pro jednoho pacienta. Ne upoužijte, pokud jsou vidět známky podráždění nebo tuba poškozené. Při místním zarudnutí nebo podráždění kůže a při nevolnosti ihned přestaňte lubrikační gel FAHL® OPTIFLUID® Lubricant Gel používat. Pokud se objeví známky podráždění kůže, okamžitě přestaňte výrobek používat. Pokud se objeví známky podráždění kůže, okamžitě přestaňte výrobek používat.

FAHL® OPTIFLUID® Lubricant Gel je určen pro jednoho pacienta. Ne upoužijte, pokud jsou vidět známky podráždění nebo tuba poškozené. Při místním zarudnutí nebo podráždění kůže a při nevolnosti ihned přestaňte lubrikační gel FAHL® OPTIFLUID® Lubricant Gel používat. Pokud se objeví známky podráždění kůže, okamžitě přestaňte výrobek používat. Pokud se objeví známky podráždění kůže, okamžitě přestaňte výrobek používat.

II. POULIŽAVNE V SÚLADE S URČENÝM ÚČELOM

FAHL® OPTIFLUID® Lubricant Gel je kľazný géľ na vodnej báze a slúži na ľahké uvoľnenie tracheálnej kánuly do tracheostomy. Pokyny k ošetrovaniu od príslušného výrobcu kánuly a v šák máli pred prvým použitím géľu bezpodmienečne dočítať.

III. UPOZORNENIA

Nepoužívajte FAHL® OPTIFLUID® Lubricant Gel na iných predpokladaných a určených potrebách.

Neupoužívajte FAHL® OPTIFLUID® Lubricant Gel ako ste alergický na obsahujúce látky.

V. OPIS PROIZVODA

FAHL® OPTIFLUID® Lubricant Gel je lubrikantní gel na bazi vode i sluzi za ľahké uvoľnenie tracheálnej kánuly a tracheostomy.

VI. NAVOD

Zhygienických dôvodov si pred použitím umyte svoje ruky.Zoberte si menšie množstvo géľu FAHL® OPTIFLUID® Lubricant Gel čistou nehmotnou ubierkou napríkladou veľkou Ө а/б. Gél opatrne rozotrite na vonkajšej ruke tracheálnej kánuly Ө. Tracheálnu kánulu vždy ako obvykle do tracheostomy Ө.

UPOZORNENIE! Nepoužívajte väčšie množstvo géľu než je potrebné. Nepoužívajte géľ, ak z nej dôkca kvapká. Do otvoru tuby nechodte priamo prstmi!

UPOZORNENIE! Nepoužívajte väčšie množstvo géľu než je potrebné. Nepoužívajte géľ, ak z nej dôkca kvapká. Do otvoru tuby nechodte priamo prstmi!

UPOZORNENIE! Nepoužívajte väčšie množstvo géľu než je potrebné. Nepoužívajte géľ, ak z nej dôkca kvapká. Do otvoru tuby nechodte priamo prstmi!

UPOZORNENIE! Nepoužívajte väčšie množstvo géľu než je potrebné. Nepoužívajte géľ, ak z nej dôkca kvapká. Do otvoru tuby nechodte priamo prstmi!

UPOZORNENIE! Nepoužívajte väčšie množstvo géľu než je potrebné. Nep